

Tratamentul laparoscopic al unui tricobezoar gastric de mari dimensiuni complicat cu perforație gastrică blocată în peretele abdominal anterior

F. Zaharie¹, C. Iancu¹, M. Tanțău², L. Mocan³, A. Bartoș³, F. Mihăileanu³, D. Iancu¹, C. Tomuș³, R. Zaharie, L. Vlad¹

¹UMF "Iuliu Hațieganu", Clinica Chirurgie III, Cluj-Napoca, România

²UMF "Iuliu Hațieganu", Clinica Medicală III, Cluj-Napoca, România

³Clinica Chirurgie III, Cluj-Napoca, România

Rezumat

Tricobezoarul reprezintă o masă de păr ingerat, situată intragastric. Prezentăm cazul unei paciente în vârstă de 17 ani ce s-a internat în serviciul nostru cu simptomatologia unui ulcer gastric. Ecografia adominală, urmată de endoscopie superioară digestivă a decelat un tricobezoar de mari dimensiuni situat la nivelul stomacului. Laparoscopia a pus în evidență o perforație gastrică la nivel corporeal anterior, blocată în peretele abdominal. Am practicat gastrotomie laparoscopică cu extragerea tricobezoarului și sutura perforației gastrice. Evoluția postoperatorie a fost favorabilă, pacienta externându-se la 5 zile după intervenție. Abordul laparoscopic s-a arătat a fi o alegere sigură în tratamentul unui tricobezoar gastric complicat. În literatura de specialitate au fost raportate mai multe cazuri de tricobezoar ce s-au rezolvat prin tratament laparoscopic dar, din câte știm, cazul nostru este primul în care un tricobezoar complicat cu perforație gastrică este abordat astfel.

Cuvinte cheie: tricobezoar, perforație gastrică, abces perete abdominal, abord laparoscopic

Correspondență: Dr. Florin Zaharie, Clinica Chirurgie III, Cluj-Napoca, str. Croitorilor, Nr. 19-21