

Rolul analgeziei multimodale în diminuarea răspunsului postoperator la stressul chirurgical în chirurgia toraco-abdominală neoplazică majoră

D. Pavelescu¹, L. Mirea¹, M. Păduraru², M. Beuran³, Al. Chiotoroiu³, I. Grințescu¹

¹Clinica ATI, Spitalul Clinic de Urgență "Floreasca", București, România

²Clinica chirurgie generală, Spitalul "Profesor dr. C. Angelescu", București, România

³Clinica de chirurgie generală, Spitalul Clinic de Urgență "Floreasca", București, România

O problemă majoră a echipei anestezico-chirurgicale o reprezintă răspunsul la stressul chirurgical, cu disfuncțiile de organ asociate, precum și durerea postoperatorie, cu consecințele fiziopatologice, psihologice și socio-economice asociate terapiei inadecvate a acesteia. În cadrul metodologiei "fast-track" analgezia multimodală ocupă un rol central, alături de procedurile minim invazive. Asocierea de opioizi și anestezic local în administrarea pe cateter epidural toracic a devenit "golden-standardul" anestezic în chirurgia toraco-abdominală majoră. Co-administrarea de antiinflamatorii nesteroidiene i.v. scade considerabil răspunsul inflamator la stressul chirurgical, permițând o recuperare rapidă, reinsertie socială precoce și scăderea morbidității și mortalității asociate chirurgiei neoplazice majore.

Cuvinte cheie: răspunsul la stressul chirurgical, analgezie multimodală, analgezia epidurală toracică, chirurgie "fast-track"

Corespondență:

Dr. Daniela Pavelescu
Spitalul Clinic de Urgență "Floreasca" București
Calea Floreasca nr. 8, sector 1, București, România
e-mail: danapavelescu@hotmail.com