

Managementul fistulelor pancreatice post-operatorii

Tr. Pătrașcu, H. Doran, C. Bugă, O. Mihalache, Fl. Bobircă, A. Costache, R. Boanță

Clinica de chirurgie "Prof. I. Juvara", Spitalul Clinic "Dr. I. Cantacuzino", București, România

Fistulele pancreatice post-operatorii reprezintă cea mai frecventă și mai severă complicație după chirurgia pancreatică, determinând creșterea duratei de spitalizare, precum și a valorilor morbidității și mortalității. Incidența lor este apreciată în literatură la valori între 2 și 30%. Prezentăm o serie de 100 de pacienți consecutivi, operați în clinică pentru diferite afecțiuni pancreatice. S-au efectuat 21 de duodenopancreatectomii cefalice, 24 de enucleeri ale unor insulinoame sau chista-denoame pancreatice, 31 de splenopancreatectomii distale și 24 de intervenții de drenaj al unor abcese sau pseudochisturi pancreatice. Au survenit 21 de fistule pancreatice post-operatorii, ceea ce corespunde unei incidențe de 21%. Am analizat tratamentul și evoluția acestor fistule, în concordanță cu experiența noastră, precum și cu clasificarea ISGPF (Grupul internațional de studiu al fistulelor pancreatice). 10 cazuri au fost rezolvate prin tratament conservator, iar în celelalte 11 s-au impus una sau mai multe reintervenții. Dintre cei 21 de pacienți cu fistule pancreatice post-operatorii, 15 au evoluat favorabil, iar 6 au decedat. Apreciem că în fistulele persistente și/sau cu debit mare, totalizarea pancreatectomiei pare să constituie soluția chirurgicală optimă.

Cuvinte cheie: fistulă pancreatică, duodenopancreatectomie

Correspondență:

Prof. Dr. Traian Pătrașcu
Clinica de chirurgie "Prof. I. Juvara"
Spitalul Clinic "Dr. I. Cantacuzino"
str. Ion Movilă, nr.5-7, București, România
E-mail: patrascutraian@clicknet.ro