

Regresia postradică - factor de prognostic în neoplasmul rectal

M. Marincas¹, C. Cirimbei¹, V. Prunoiu¹, A.L. Eliescu¹, R. Buzatu¹, I. Stefan¹, E. Bratucu¹, D. Murarasu², L. Puiu², C. Mihalcea²

¹The Clinic of Surgery I, ²The Research Center, The Oncological Institute of Bucharest, Romania

Radioterapia preoperatorie este procedura standard în protocoalele de tratament a cancerului rectal. Experiența acumulată și analiza clinico-paraclinică a rezultatelor acestei proceduri au stabilit faptul că răspunsul la radioterapie, în sensul reducerii volumului tumoral și a adenopatiilor din stațiile I și II este foarte variabil, de la dispariția completă a masei tumorale, până la lipsa de răspuns. Răspunsul la radio-terapice coroborat cu datele anatomopatologice și imuno-histochimie ar putea permite aprecierea prognosticului în cancerul de rect. În acest scop ne-am propus efectuarea unui studiu clinic, care să analizeze grading-ul tumoral, markerii imunohistochimici, precum și eventuale modificări genetice care să permită aprecierea gradului de regresie postradică precum și prognosticul postterapeutic. Pe baza acestor criterii ar fi posibil să se stabilească grupa de regresie în care se situează pacientul încă din faza preterapeutică. În acest fel s-ar nuanța tipul de radioterapie prechirurgicală, uneori aceasta efectuată standard fiind inefectivă. Venim cu o statistică de lot preliminar, cu valoare de ipoteză de lucru.

Cuvinte cheie: neoplasm rectal, radioterapie, angiogeneză

Corresponding author: Dr. Marian Augustin Marincas

1st Surgical Clinic, The Oncological Institute of Bucharest

Carol Davila University School of Medicine, Bucharest, Romania

Tel. +42212271590, Fax +42212271011

E-mail: marincasro@yahoo.com