

Atrezie intestinală multiplă asociind leziuni tip IIIB și IV. Studiu de caz

R. Bălănescu^{1,2}, L. Topor^{1,2}, I. Stoica¹, A. Moga¹

¹“Grigore Alexandrescu” Clinical Emergency Hospital for Children, Bucharest, Romania

²“Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Romania

Rezumat

Atrezia intestinală multiplă este o malformație complexă care reprezintă o încercare pentru chirurgul pediatru, mai ales dacă este diagnosticat tipul IIIB de atrezie, la care mortalitatea este foarte mare. Scopul intervenției chirurgicale este acela de a obține o lungime viabilă cât mai mare a intestinului, de a evita sepsisul postoperator și de a preveni complicațiile pe termen lung, cum ar fi sindromul de intestin scurt. Existența unei secții de terapie intensivă neonatală și suportul nutrițional parenteral sunt esențiale pentru supraviețuirea acestor pacienți. Prezentăm cazul unui nou-născut diagnosticat cu atrezie intestinală asociind atrezie “în coajă de măr” la care s-a intervenit chirurgical, realizându-se rezecții și anastomoze intestinale multiple.

Cuvinte cheie: atrezie jejunală, atrezie “în coajă de măr”, anastomoză termino-terminală, nutriție parenterală

Corresponding author: Laura Topor, MD

Vaporul lui Assan Street, no. 4, Bucharest, Romania

E-mail: lauratopor@yahoo.com