

Diagnosticul și tratamentul în fracturile de membre asociate cu ischemie periferică acută

G.I. Popescu¹, O. Lupescu¹, M. Nagea², C. Patru²

¹“Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Orthopaedics and Trauma Department, Clinical Emergency Hospital, Bucharest, Romania

²Orthopaedics and Trauma Department, Clinical Emergency Hospital, Bucharest, Romania

Rezumat

Ischemia periferică acută (API) este cea mai severă complicație acută a fracturilor închise și deschise, având în vedere faptul că ischemia afectează nu numai vitalitatea membrului afectat, ci chiar viața pacientului, întrucât alterările datorate metabolismului anaerob consecutive ischemiei au consecințe redutabile locale și generale. Aceasta explică de ce diagnosticul precoce al ischemiei periferice acute este foarte important pentru prognosticul unui membru traumatizat. Autorii analizează cazurile când aceasta nu a fost diagnosticată imediat post-traumatic, ci după un oarecare interval de timp, fie datorită valorilor inițiale scăzute ale TA sistolice, fie datorită instalării tardive a ischemiei. Pacienții au fost evaluați din punct de vedere al tipului de fractură, motivelor diagnosticului tardiv, momentului efectuării acestuia și tipului de leziune arterială. În aceste cazuri, intervenția chirurgicală a fost efectuată cu maximă urgență, pentru a identifica și trata leziunile complexe (osoase și vasculare).

Cuvinte cheie: membre, fracturi, ischemie periferică arterială, tromboză

Corresponding author: Olivera Lupescu, MD, PhD

“Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Romania

Orthopedics and Trauma Department Clinical Emergency Hospital Bucharest

E-mail: olivera_lupescu@yahoo.com