

**Arteră hepatică proprie prehepatocoledociană. Variantă anatomică rară. Implicații chirurgicale**

V. Ardeleanu<sup>1,2</sup>, S. Chicoș<sup>3</sup>, D. Tutunaru<sup>1</sup>, C. Georgescu<sup>1</sup>

<sup>1</sup>“Dunărea de Jos” University, Faculty of Medicine and Pharmacy, Galați, Romania

<sup>2</sup>General Hospital CF Galați, Romania

<sup>3</sup>Emergency County Hospital “Sf. Apostol Andrei”, Surgery I Unit, Galați, Romania

**Rezumat**

În varianta anatomică clasică, artera hepatică proprie (AHP) continuă artera hepatică comună (AHC), după desprinderea arterei gastroduodenale (AGD), și dă la rândul său arterele hepatice dreaptă (AHD) și stângă (AHS), AHP fiind situată la stânga canalului hepatocoledoc (CHC). În lucrarea de față se prezintă o anomalie de poziționare a AHP, care era dispusă în fața CHC, cu un diametru mărit, de circa 5-7 mm, care putea fi confundată cu CHC. Este vorba despre o pacientă în vârstă de 57 de ani, diagnosticată cu colecistită acută litiatică, și care asociat mai prezenta hipersplenism și hipertensiune arterială. Literatura de specialitate amintește de numeroase variante anatomice de vascularizație arterială a ficatului, inclusiv a AHP, motiv pentru care lucrarea de față reprezintă și o scurtă trecere în revistă a literaturii de specialitate. Cazul de față prezintă o raritate topografică a AHP care ar putea fi confundată ușor cu CHC, mai ales în timpul unor intervenții chirurgicale celioscopice, fapt important de cunoscut de către medicii chirurghi.

**Cuvinte cheie:** arteră hepatică proprie, variante topografice, colecistectomie

Corresponding author: Dana Tutunaru, MD

no. 39 Roșiori Street, bldg. PIN 2, entrance 1, apt. 10, Galați, Romania

E-mail: dana\_tutunaru\_cmgl@yahoo.com