

Recidivele locale și la distanță - aspecte comparative în sânul operat conservator și sânul operat radical pentru neoplasm mamar

M. Ursaru¹, I. Jari¹, D. Negru¹, V. Scripcariu²

¹Discipline of Radiology, University of Medicine and Pharmacy "Gr. T. Popa" Iasi, Romania

²Department of Surgery, Regional Institute of Oncology, University of Medicine and Pharmacy "Gr. T. Popa" Iasi, Romania

Rezumat

Tratamentul cancerului de sân a evoluat mult în ultimii 40 de ani, intervențiile conservatoare urmate de radioterapie fiind opțiuni din ce în ce mai mult preferate de medicii chirurghi și pacienți. Lucrarea de față își propune să semnalizeze aspectele comparative privind recidivele locale și la distanță la pacienții operați radical sau conservator pentru neoplasm mamar. Am efectuat un studiu retrospectiv în perioada 1 ian 2005 - 31 iulie 2013, ce a inclus 477 pacienți cu neoplasm mamar în stadiile 0, I și II, luate în evidență la Institutul Regional de Oncologie Iași, din care 248 (52 %) pacienți au fost operați radical iar 229 (48 %) pacienți au fost operați conservator. S-au efectuat examinări ecografice, mamografice, CT și IRM ce au permis diagnosticarea de recidivă loco-regională și la distanță. Numărul total de recidive locale și la distanță a fost mai mare la pacienții operați conservator (86 recidive) față de pacienții operați radical (55 recidive). Recidivele locale sunt mai frecvente la persoanele tinere precum și la pacienții tratați prin chirurgie conservatoare și radioterapie față de pacienții cu mastectomii radicale. Cele mai frecvente metastaze sunt localizate la nivel osos, hepatic și pulmonar.

Cuvinte cheie: mastectomie parțială, mastectomie radicală, ecografie, mamografie, recidive

Corresponding author: Manuela Ursaru, MD

Ph.D. Fellow - "Gr. T. Popa" University of Medicine and Pharmacy Iasi

14 Grădinari Street, Bl F1-2, Et 2, Ap 2, Iași

E-mail: manuelaumf@yahoo.com