

Hernie diafragmatică congenitală stângă - prezentare de caz

L. Topor, T. Pătrăncuș, R. Caragața, A. Moga

Department of Pediatric Surgery, "Grigore Alexandrescu" Clinical Emergency Hospital for Children, Bucharest, Romania

Rezumat

Hernia diafragmatică reprezintă ascensionarea conținutului cavității abdominale în cavitatea toracică printr-un defect localizat la nivelul diafragmului. Incidența este de aproximativ 1/2500 nou-născuți, herniile de parte stângă fiind mai frecvent întâlnite decât cele drepte (85% față de 12%). Deși majoritatea cazurilor sunt diagnosticate antenatal sau imediat după naștere, există pacienți la care diagnosticul se pune mai târziu, cu ocazia unor consulturi de rutină, ca urmare a unor traumatisme, intercorențe respiratorii, digestive sau cu ocazia complicațiilor (volvulus gastric, ocluzii, necroze, perforații, peritonite). Prognosticul pacienților cu hernie diafragmatică congenitală diagnosticată tardiv este de obicei favorabil. În cazul pacienților diagnosticați cu hernie diafragmatică congenitală cu ocazia unei complicații este indicat abordul deschis prin laparotomie sau toracotomie. Vă prezentăm cazul unei paciente în vârstă de 7 ani cu un istoric recent de traumatism care prezenta tulburări respiratorii, la care imaginea radiologică a ridicat suspiciunea unui hemopneumotorax și s-a introdus un drenaj toracic. În clinica noastră s-a stabilit diagnosticul de hernie diafragmatică congenitală, s-a intervenit chirurgical prin abord deschis abdominal și s-a practicat sutură directă cu evoluție postoperatorie imediată și tardivă favorabilă.

Cuvinte cheie: Hernie Bochdalek, abord trans-abdominal, prezentare tardivă

Corresponding author: Laura Topor, MD

"Grigore Alexandrescu" Clinical Emergency Hospital for Children

Vaporul lui Assan Street, No. 4, Bucharest, Romania

E-mail: lauratopor@yahoo.com