

Anemia ca simptom la prezentare la un adult cu chist și torsiune de oment - prezentare de caz

A. Ahmed¹, G. Jabbour¹, A. Zitoun¹, E. Latif¹, M. El Matbouly¹, A. Toro², I. Di Carlo^{1,3}

¹Departments of Surgery, Hamad General Hospital, Doha, Qatar

²Department of Surgery, Patti Hospital (ME), Italy

³Department of Surgical Sciences and Advanced Technologies (G.F. Ingrassia), University of Catania, Italy

Rezumat

Introducere: Volvulusul este o afecțiune puțin frecventă a omentului, iar chisturile reprezintă una dintre cele mai rare cauze de torsiune omentală. Din cunoștințele noastre, aceasta este prima raportare a unui caz de chist omental prezentându-se atât cu torsiune omentală, cât și cu anemie.

Prezentare de caz: Prezentăm cazul unei paciente în vârstă de 41 de ani, de origine indiană, care s-a prezentat la spital cu anemie (hemoglobina serică 6,5 g/dL) și durere abdominală intermitentă cauzate de torsiunea unui chist omental hemoragic. Tomografia computerizată a decelat un chist omental și lichid liber în cavitatea abdominală. La explorarea abdominală prezența a 1,5 litri de lichid hemoragic a fost confirmată în cavitatea abdominală. Chistul și porțiunea torsionată de oment au fost excizate en bloc. Pacienta a avut o evoluție postoperatorie lipsită de alte evenimente și a fost externată în ziua a 8-a postoperator. La consultul efectuat la 2 luni după intervenția chirurgicală pacienta nu mai prezenta anemie (hemoglobinaserică 10,7 g/dL).

Concluzii: Au fost raportate cazuri de anemie asociată cu volvulus omental la copii; însă, din cunoștințele noastre, acesta este primul caz de acest fel raportat la un adult. La asemenea pacienți excizia chirurgicală este tratamentul de elecție. Persoanele cu durere abdominală recurentă și anemie trebuie evaluate cu atenție, iar diagnosticul diferențial trebuie să includă și torsiunea de oment. Diagnosticarea corectă și tratamentul adecvat ajută la evitarea complicațiilor.

Cuvinte cheie: chist, torsiune, oment, mezenteric, anemie