

Tumorile stromale gastrointestinale - diagnostic și tratament chirurgical

L. Alecu^{1*}, A. Tulin^{1,2*}, O. Enciu^{2*}, M. Bărbulescu¹, B. Ursu¹, F. Obrocea³

^{1*}Prof. Dr. Agrippa Ionescu" Clinical Emergency Hospital, General Surgery Clinic, Bucharest, Romania

^{2*}"Carol Davila" University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Romania

^{3*}Prof. Dr. Agrippa Ionescu" Clinical Emergency Hospital, Department of Pathology, Bucharest, Romania

Rezumat

Tumorile stromale gastrointestinale (TSGI) sunt cele mai frecvente tumori cu origine mezenchimală ale tubului digestiv, anterior fiind clasificate ca leiomioame, leiomiosarcoame, leiomioblastoame sau schwanoame. Actual sunt recunoscute ca o entitate de sine stătătoare, cu originea în celulele intestinale mezodermale Cajal, celule ce supraexprimă proteina c-kit (receptor de tirozin kinază). Diagnosticul definitiv este stabilit prin imunohistochimie, peste 95% din TSGI fiind pozitive pentru CD117. În ciuda progresului major al chimioterapiei, tratamentul de elecție rămâne cel chirurgical și implică rezecția completă a tumorii. Evoluția acestor tumori este imprevizibilă iar prognosticul depinde de localizare, dimensiunea tumorii și indicele mitotic. Tumorile benigne au prognostic excelent după tratament chirurgical cu supraviețuire de peste 90% la 5 ani pe când tumorile maligne, rezistente la radioterapie și chimio-terapie au prognostic sumbru chiar și după rezecție, supraviețuirea medie fiind de 1 an. Am studiat un lot de 15 pacienți diagnosticați cu TSGI în cadrul Clinicii de Chirurgie Generală a Spitalului Clinic de Urgență "Prof. Dr. Agrippa Ionescu" între anii 2003 - 2013, urmărind particularitățile de prezentare, diagnostic și tratament, cu evidențierea factorilor de prognostic în raport cu datele din literatură disponibile.

Cuvinte cheie: tumori stromale gastrointestinale (TSGI), tratament chirurgical, prognostic