

### **Capcanele drenajului limfatic multiplu în melanoamele cutanate**

Silviu Voinea<sup>1</sup>, Angela Sandru<sup>1</sup>, Mirela Gherghe<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Department of Surgical Oncology, Carol Davila University of Medicine and Pharmacy, Alexandru Trestioreanu Oncologic Institute, Bucharest

<sup>2</sup>Department of Nuclear Medicine, Alexandru Trestioreanu Oncologic Institute, Bucharest, Romania

#### **Rezumat**

Biopsia ganglionului santinelă (GS) a devenit standard în stadializarea melanomului cutanat. Cum drenajul limfatic al pielii este complex, aprecierea empirică preoperatorie a localizării tuturor GS este practic imposibilă. De aceea pentru identificarea tuturor bazinelor limfatice regionale corespunzătoare unei anumite tumori primare este obligatorie realizarea limfoscintigrafiei preoperatorii. În cele ce urmează vom prezenta un caz clinic care subliniază importanța identificării, biopsiei și analizei histologice a tuturor GS în vederea realizării unei stadializări corecte a pacientului, urmată evident de un tratament adecvat stadiului clinic real al bolii.

**Cuvinte cheie:** melanom cutanat, ganglion santinelă, limfo-scintigrafie, drenaj limfatic multiplu