

Hematom spontan precoce intra- și perihepatic al grefei după transplant hepatic

Cristian Lupașcu¹, Oana Apopei², Nutu Vlad¹, Ciprian Vasiluta³, Ana-Maria Trofin¹,
Mihai Zabara³, Alexandra Vornicu³, Corina Lupașcu-Ursulescu⁴, Mioara Nitu⁵, Felicia Crumpei³,
Vladislav Brașoveanu⁶, Irinel Popescu⁶

¹Department of Surgery, "Sf. Spiridon" Hospital, Surgical Unit 2, "Grigore T. Popa" University of Medicine and Pharmacy, Iași, Romania

²"Sf. Spiridon" Hospital, Intensive Care Unit, Iași, Romania

³"Sf. Spiridon" Hospital, Surgical Unit 2, Iași, Romania

⁴Department of Surgery II, Radiology-Imaging "Sf. Spiridon" Hospital, Clinic of Radiology, Iași, "Grigore T. Popa" University of Medicine and Pharmacy Iași, Romania

⁵"Sf. Spiridon" Hospital, Emergency Unit, Iași, Romania

⁶"Dan Setlacec" Center of General Surgery and Liver Transplantation, Fundeni Clinical Institute, Bucharest, Romania

Rezumat

Hematomul grefei este o complicație cu risc vital în transplantul hepatic și nu există în literatură concluzii clare în privința tratamentului acestuia, cu excepția celor din rarele prezentări de caz publicate. Hematomul grefei poate fi intrahepatic sau subcapsular, și se poate dezvolta spontan sau ca urmare a unor injurii hepatice ori a unor manevre invazive transhepatice percutane. Prezentăm cazul unui pacient de 62 de ani care a beneficiat de un transplant hepatic ortotopic cu ficat întreg pentru hepatopatie cronică decompensată datorită unei ciroze etanolice. Procedura chirurgicală s-a desfășurat fără evenimente. Ecografia Doppler de rutină și examenul CT au depistat, la 7 zile posttransplant, un hematom extrahepatic paracav, care a fost tratat conservator și a fost stabil timp de 11 zile. În ziua a 18-a, la aproximativ 6 ore după un episod de diaree acută, pacientul a prezentat o scădere a hemoglobinei serice până la 6,6 mg/dl, iar examenele imagistice au evidențiat un hematom intrahepatic voluminos ocupând hemifacatul drept, câteva alte hematoame extrahepatice, revărsat pleural în cantitate semnificativă și ascită hemoragică. Pacientul a fost tratat conservator cu succes, cu revenirea lentă a funcției hepatice și externat o lună mai târziu în stare generală bună.

Cuvinte cheie: transplant hepatic, hematom hepatic subcapsular, hematom intraparenchimatous hepatic, lăcherăție hepatică, hematom perihepatic