

Managementul cancerului mamar recidivat locoregional

Silviu Cristian Voinea^{1,2}, Angela Sandru¹, Alexandru Blidaru^{1,2}

¹Second Department of Surgical Oncology, "Prof. dr. Al.Trestioreanu" Institute of Oncology, Bucharest, Romania

²"Carol Davila" University of Medicine and Pharmacy, Department of Surgery, Oncological Surgery Chair

Rezumat

Recidiva în cancerul mamar reprezintă o provocare pentru clinician din cauza tratamentului nestandardizat și necesită de obicei o abordare multidisciplinară. Aceasta este cheia pentru un control bun al bolii pe termen lung și pentru un tratament cu intenție curativă. Recidiva locală în cancerul mamar poate apărea după tratamentul chirurgical conservator sau după mastectomie iar recidiva regională implică limfonodulii ipsilaterali axilari, mamari interni sau supraclaviculari. Prognosticul recidivei locale după tratamentul chirurgical conservator pare să fie mai bun decât după mastectomie în termenii apariției metastazelor la distanță și a supraviețuirii globale. De asemenea, prognosticul recidivei axilare este mai bun decât cel al recidivei supraclaviculare sau mamare interne. Recidiva locoregională în cancerul mamar reprezintă mai degrabă un marker al apariției metastazelor decât un factor determinant al acestora. Opțiunile terapeutice pentru recidiva loco-regională în cancerul de sân impun decizii multidisciplinare și din acest motiv este foarte importantă comisia oncologică multi-disciplinară. Fiecare pacient trebuie să primească cel mai bun tratament oncologic personalizat.

Cuvinte cheie: recidiva locoregională, tratament multimodal, marker al apariției metastazelor