

Metastază suprarenală unică după neoplasm mamar tip carcinom ductal invaziv

Cezar Stroescu¹, Iulian Gilca¹, Dragoș Chirita¹, Radu Poenaru¹, Ana Pușcașu¹, Diana Pescaru¹,
Adelina Birceanu², Cornelia Nițpir³, Narcis Copcă¹

¹Center of General Surgery and Transplant, "Sf. Maria" Clinical Hospital, Bucharest, Romania

²Department of Pathology, "Sf. Maria" Clinical Hospital, Bucharest, Romania

³Department of Oncology, Elias University Emergency Hospital, Bucharest, Romania

Rezumat

Cele mai frecvente leziuni canceroase întâlnite la nivelul glandei suprarenale sunt metastazele de suprarenală. Dintre aceste metastaze, originea tumorală cea mai des întâlnită este cancerul pulmonar, urmată de cancerul gastric sau colonic, cel esofagian, cel hepatic sau de căi biliare și, în ultimul rând, cancerul renal. De regulă, neoplasmul mamar de tip carcinom mamar invaziv are ca și localizări preferate de metastazare oasele, plămânii, ganglionii, ficatul și creierul. Metastazele de glandă suprarenală după neoplasmul mamar de tip carcinom mamar invaziv sunt extreme de rare. Vom prezenta cazul unei paciente în vârstă de 66 de ani ce a prezentat o metastază unică la nivelul glandei suprarenale după ce a fost diagnosticată cu carcinoma mamar invaziv triplu negativ. Pacienta a suferit o suprarenalectomie stângă totală în iunie 2016, fără a fi urmată de tratament adjuvant. La momentul redactării articolului, pacienta se află în stare clinică bună, fără semne de recidivă locală. Rolul tratamentului chirurgical și chimioterapiei adjuvante în tratamentul metastazelor de glandă suprarenală după neoplasm mamar de tip carcinoma ductal invaziv în ceea ce privește rata de supraviețuire se află încă în studiu.

Cuvinte cheie: carcinoma mamar invaziv, metastază glandă suprarenală, suprarenalectomie totală