

Hidatidoză mamară recurentă: prezentare de caz

Ayetullah Temiz¹, Yavuz Albayrak¹, Sevilay Özmen Akalp², Ahmet Yalçın³, Ayşe Albayrak⁴

¹Department of General Surgery, Erzurum Region Education and Research Hospital, Erzurum, Turkey

²Department of Pathology, Erzurum Region Education and Research Hospital, Erzurum, Turkey

³Department of Radiology, Erzurum Region Education and Research Hospital, Erzurum, Turkey

⁴Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Ataturk University, Faculty of Medicine, Erzurum, Turkey

Rezumat

Introducere: Chistul hidatic este o zoonoză întâlnită în zonele endemice. Aceasta reprezintă o reală problemă în țara noastră, cu precădere în zona de est și sud-est, reprezentată de Regiunea Anatolia. Invadarea de țesut mamar izolat este foarte rară în boala hidatică. Din câte cunoaștem, hidatidoza izolată mamară recurentă nu a fost raportată până acum în literatură.

Prezentare de caz: Scopul nostru este de a prezenta cazul unei paciente diagnosticată cu boală hidatică izolată mamară recurentă ipsilateral, prezentând o intervenție chirurgicală pentru hidatidoză la nivelul glandei mamare drepte în urmă cu 9 ani.

Concluzie: Boala hidatică trebuie luată în considerare în diagnosticul diferențial al maselor mamare cu aspect chistic, în special în zonele endemice. Dacă pacienta a fost supusă în antecedente unei intervenții chirurgicale pentru boală hidatică mamară, hidatidoza mamară recurentă trebuie luată în considerare la momentul diagnosticului diferențial.

Cuvinte cheie: chist hidatic, sân, recurență