

Abordarea chirurgicală actuală în patologia piciorului diabetic predominant arteriopat

Florin Bobircă¹, Anca Bobircă², Anca Bordianu³, Cristina Jauca⁴, Dragoș Georgescu¹, Raluca Radu⁵, Traian Pătrașcu¹

¹"I. Juvara" Surgery Clinic, "Dr. Ion Cantacuzino" Clinical Hospital, "Carol Davila" University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Romania

²Internal Medicine Clinic, "Dr. Ion Cantacuzino" Clinical Hospital, "Carol Davila" University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Romania

³Plastic and Reconstructive Department, "Bagdasar-Arseni" Emergency Hospital, "Carol Davila" University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Romania

⁴"I. Juvara" Surgery Clinic, "Dr. Ion Cantacuzino" Clinical Hospital, Bucharest, Romania

⁵Centre for Diabetes, Nutrition and Metabolic Diseases, "N. Malaxa" Clinical Hospital, "Carol Davila" University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Romania

Rezumat

Introducere: Piciorul diabetic este o entitate patologică complexă caracterizată prin totalitatea modificărilor care apar la nivelul piciorului în timpul evoluției bolii diabetice. Acest studiu vizează elaborarea unui algoritm de tratament pentru pacienții cu leziuni predominant arteriopate ale piciorului diabetic, cu scopul de a reduce numărul de intervenții debilitante și de a îmbunătăți calitatea vieții.

Material și Metodă: Au fost analizați un număr de 188 de pacienți internați la Clinica de Chirurgie I a Spitalului Clinic Dr. I. Cantacuzino, în anul 2017, cu leziuni ale piciorului diabetic predominant arteriopat, pe baza mai multor criterii de includere / excludere.

Rezultate: În funcție de tipul de leziune a piciorului, majoritatea pacienților au avut diagnosticul de gangrenă umedă a degetului / degetelor (51,06%), urmată de gangrena ischemică a degetului / degetelor (40,4%), intervențiile chirurgicale efectuate asupra acestor tipuri de leziuni 73,9% dintre cazuri au constat din amputații minore (amputația transmetatarsiană a piciorului/a degetelor).

Concluzii: Algoritmul de tratament dezvoltat ca rezultat al acestui studiu reprezintă o soluție fezabilă de tratament pentru patologia piciorului diabetic predominant arteriopat, iar nerespectarea acestuia poate duce la erori de tratament în sensul în care o operație disproporționată poate fi efectuată în corelație cu un diagnostic inexact.

Cuvinte cheie: diabet zaharat, picior diabetic, gangrenă, arteriopatie, amputație