

Încapsularea peritoneală - o cauză rară de obstrucție a intestinului Subțire

Elena-Adelina Toma¹, Cosmin Giulea¹, Octavian Enciu^{1,2}, Valentin Calu^{1,2}, Adrian Miron^{1,2}

¹Surgery Department, Elias University Emergency Hospital, Bucharest, Romania

²“Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Romania

Rezumat

Încapsularea peritoneală (IP) este o anomalie anatomică rară care apare din cauza unui sac peritoneal accesoriu care acoperă intestinul subțire și poate cauza durere abdominală cronică recurentă și chiar ocluzie intestinală înaltă, cel mai frecvent la copii sau pacienți fără antecedente chirurgicale. Diagnosticul pozitiv este de obicei intraoperator, dar recent s-a sugerat posibilitatea diagnosticării imagistice, printr-o analiză amănunțită a CT-ului abdominal preoperator. Prezentăm cazul unui pacient de 21 ani internat pentru durere abdominală intensă, distensie abdominală asimetrică, nivele hidro-aerice prezente pe radiografia abdominală, dar fără cauză decelabilă CT. S-a intervenit chirurgical de urgență și s-a descoperit IP, cu excizia onsecutivă a sacului peritoneal. Evoluția postoperatorie a fost favorabilă. Examinarea histopatologică a piesei a confirmat diagnosticul. IP este deseori diagnosticat eronat ca peritonită sclerozantă încapsulată sau cocoon abdominal, dar este o patologie cu o rată de recurență mult mai scăzută și rare complicații postoperatorii, ce poate fi tratată cu succes dacă operatorul ia în considerare această patologie la momentul diagnosticului diferențial.

Cuvinte cheie: încapsulare peritoneală, ocluzie intestin subțire, cocoon abdominal, anomalie anatomică