

Acuratețea examinării ecografice preoperatorii a axilei în prezicerea statusului limfonodulului santinelă la paciențele cu carcinom mamar

Orsolya Hankó-Bauer¹, Cristian Podoleanu², Rares Georgescu¹, Simona Stolnicu³

¹University of Medicine, Pharmacy, Sciences and Technology of Targu Mures, Department of Surgery, Tg Mures, Mures

²University of Medicine, Pharmacy, Sciences and Technology of Targu Mures, Department of Internal Medicine, Tg Mures, Mures

³University of Medicine, Pharmacy, Sciences and Technology of Targu Mures, Department of Pathology, Tg Mures, Mures

Rezumat

Scopul studiului este de a determina acuratețea examinării ecografice preoperatorii a axilei în evaluarea statusului limfo-nodulului santinelă la paciențele cu carcinom mamar.

Materiale și Rezultate: Din cele 54 paciențe evaluate, examinarea ecografică a axilei a evidențiat limfonoduli vizibili în 35 de cazuri din care în 15 cazuri au fost prezente metastaze. În 19 cazuri, examinarea ecografică nu a evidențiat limfonoduli axilari vizibili, iar în 3 din aceste cazuri au fost prezente metastaze. Rezultatele studiului demonstrează faptul că nici diametrul maxim ($p=0.738$ test Fisher) și nici raportul dintre axa longitudinală și cea transversală ($p=0.728$ test Fisher) nu pot prezice statusul limfonodulului santinelă.

Concluzie: Examinarea ecografică a axilei la paciențele cu carcinom mamar nu poate prezice statusul limfonodulului santinelă.

Cuvinte cheie: limfonodul santinelă, examinare ecografică, carcinom mamar