

Cancerul tiroidian anaplazic: un caz rar având ca simptome clinice febra și un nivel ridicat al CRP

Nikolaos Garmpis¹, Christos Damaskos¹, Anna Garmpi², Aliko Liakea³, Dimitrios Mantas¹

¹Second Department of Propedeutic Surgery, Laiko General Hospital, Medical School, National and Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece

²First Department of Propedeutic Internal Medicine, Laiko General Hospital, Medical School, National and Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece

³First Department of Pathology, Medical School, National and Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece

Rezumat

Cancerul tiroidian anaplazic (CTA) este o afecțiune rară, dar aproape invariabil letală. În studiul de față prezentăm cazul unei paciente care, pe lângă prezența gușei nodulare, a avut ca simptome clinice doar un nivel ridicat al proteinei C-reactive (CRP) și o stare subfebrilă persistentă. Pacienta a fost supusă tiroidectomiei, și apoi a urmat un tratament care a constatat în chimioterapie și radioterapie. La 11 luni de la intervenția chirurgicală pacienta este în viață iar boala este în remisie. Scopul nostru este de a demonstra că CTA poate fi prezent fără o simptomatologie specifică, și de a crește gradul de conștientizare a importanței diagnosticului precoce.

Cuvinte cheie: cancer tiroidian anaplazic, markeri inflamatori, CRP, feritină