

Abord laparoscopic în localizarea primară pancreatică a chistului hidatic - prezentare de caz și review al literaturii

Alin Vasilescu, Eugen Tarcoveanu, Felicia Crumpei, Mihaela Blaj, Valentin Bejan, Costel Bradea
First Surgical Clinic, St Spiridon University Hospital, Gr. T. Popa University of Medicine and Pharmacy
Iasi, Romania

Rezumat

Implicarea pancreasului în chistul hidatic este excepțională, chiar și în țările în care boala hidatică este endemică.

Prezentare de caz: Descriem cazul unei paciente de sex feminin, în vârstă de 63 de ani, cu chist hidatic pancreatic. Diagnosticul a fost dificil, deoarece prezentarea este cea a unui chist retrogastric cu caracteristici radiologice nu foarte sugestive. Am efectuat o explorare laparoscopică a cavității abdominale și am descoperit o formațiune chistică retrogastrică dezvoltată din corpul pancreatic. Tratamentul chirurgical a constat în puncție, evacuarea proligerei, spălare cu ser hipertonic, perichistul a fost parțial excizat și cavitatea restantă a fost drenată. Pacienta a fost externată în ziua 5 postoperator. Controlul efectuat la 6, 12 și 24 de luni nu a arătat apariția unei recidive. Totodată facem și un review al literaturii, în care discutăm despre dificultățile diagnostice și terapeutice ale acestei rare localizări a chistului hidatic.

Concluzii: Chistul hidatic este o cauză rară a unei formațiuni chistice pancreatice și care ar trebui inclusă în diagnosticul diferențial al chisturilor pancreatice, în special în zonele endemice. Chirurgia rămâne în continuare cea mai eficientă opțiune de tratament. Abordul laparoscopic este fezabil și sigur, dar necesită o echipă instruită cu experiență în chirurgia minim invazivă.

Cuvinte cheie: pancreas, chist hidatic, leziuni chistice pancreatice, laparoscopie