

**Carcinom chistic adenoid la sân cu antecedente de carcinom ductal mamar contralateral in situ: o prezentare de caz**

Marina Barron<sup>1</sup>, Amira Asaad<sup>2</sup>, Kashuf Arooj Khan<sup>3</sup>, Philip Idaewor<sup>2</sup>, Ali Salih<sup>2</sup>, Firas Alkistawi<sup>2</sup>, Turhan Comez<sup>2</sup>, Victoria Salih<sup>4</sup>, Abdalla Saad Abdalla Al-Zawi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Department of Surgery, South West Acute Hospital, Enniskillen, Northern Ireland

<sup>2</sup>Department of Surgery, Basildon & Thurrock University Hospital, Basildon, United Kingdom

<sup>3</sup>Department of Surgery, Royal Shrewsbury Hospital, Shrewsbury, United Kingdom

<sup>4</sup>Department of Surgery, King's College Hospital, London, United Kingdom

**Rezumat**

Carcinomul chistic adenoid al sânului (BACC) este un neoplasm mamar malign rar întâlnit cu un rezultat favorabil, în ciuda statutului de receptor triplu negativ. Acesta cuprinde mai puțin de 0,1% din toate cazurile de cancer mamar. Situsul primar mai obișnuit al carcinomului chistic adenoid este observat în glandele salivare, cu toate acestea prognosticul BACC este mai bun decât cel pentru glanda salivară și, de asemenea, cel al altor carcinomuri invazive mamare. De asemenea, este cunoscut ca BACC are mai puține metastaze ale ganglionilor limfatici, precum și mai puține metastaze îndepărtate, prin acest caz prezentăm o femeie de 73 de ani cu antecedente de carcinom ductal mamar in situ, care apoi a dezvoltat carcinom chistic adenoid mamar contralateral.

**Cuvinte cheie:** cancer de sân, carcinom chistic adenoid de sân, cilindrom, cancer de sân triplu negativ