

Duplicarea venei cave inferioare, posibila cauză a unei hernii interne?

Revizuirea literaturii și prezentarea unui caz rar

Cédric Kwizera¹, Daniel G. Popa^{1,2}, Marian Botoncea^{1,2}, Adrian Tudor^{1,2}, György D. Száva¹,
Alexandru Strat^{1,2}, Călin Molnar^{1,2}

¹First Clinique of Surgery. Emergency County Hospital, Târgu Mureș, Romania

²“George Emil Palade” University of Medicine, Pharmacy, Science and Technology, Târgu Mureș, Romania

Rezumat

Duplicarea venei cave inferioare este o malformație congenitală rară de extremă importanță pentru chirurgii vasculari, urologii și radiologii intervenționiști. Deseori trece neobservată și este diagnosticată incidental la o scanare CT de rutină sau de urgență atunci când apar complicații din cauza malformațiilor congenitale asociate. Vă prezentăm cazul unui pacient în vârstă de 70 de ani internat de urgență acuzând dureri abdominale care a fost diagnosticat cu ocluzie intestinală din cauza unei hernii para-duodenale stângi, asociată cu duplicarea venei cave inferioare. Revizuirea literaturii a condus la concluzia că duplicarea venei cave inferioare nu este cauza hernii paraduodenale stângi.

Cuvinte cheie: duplicarea venei cave inferioare, hernia para-duodenală stângă, ocluzie intestinală