

## **Forme severe de pancreatită acută alitiazică la pacienți tineri de sex feminin; un studiu preliminar**

Vlad Denis Constantin<sup>1,2</sup>, Ion Motofei<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup>Carol Davila University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Romania

<sup>2</sup>Department of General Surgery, St. Pantelimon Hospital, Bucharest, Romania

### **Rezumat**

*Context/Obiective:* Pancreatita acută (PA) este o boală severă care implică de obicei spitalizarea și o terapie personalizată. Progrese remarcabile s-au înregistrat până acum în stabilirea etiologiei, diagnosticului și terapiei acestei afecțiuni. De exemplu, este bine documentat faptul că evoluția PA constă din două faze fizio-patologice distincte. Prima fază durează aproximativ 1-2 săptămâni, implicând doar modificări inflamatorii locale și eventual un sindrom SIRS tranzitoriu, care necesită terapie conservatoare. A doua fază este reprezentată fie de remisiunea bolii la pacienții cu forme ușoare de PA, fie de persistența sindromului SIRS și apariția complicațiilor locale la pacienții cu forme moderate. Prin urmare, complicațiile locale apar de regulă în cea de-a doua fază, când terapia trebuie personalizată în funcție de complicațiile locale pancreatice, precum și pentru a oferi un suport sistemic adecvat.

*Metode/Rezultate:* Formele severe sunt mai rar întâlnite și în general asociază MSOF, care se poate dezvolta în orice moment în evoluția PA. MSOF agravează sindromul SIRS preexistent și complicațiile locale, făcând tratamentul mai dificil și crescând semnificativ morbiditatea și mortalitatea. Acest studiu prezintă evoluția unui grup de pacienți cu PA alitiazică, care nu au prezentat în primă fază nici un determinant sistemic al sindromului SIRS. În consecință, prognosticul nostru inițial a fost favorabil, dar evoluția unora dintre pacienți a fost neașteptat de severă.

*Concluzii:* Astfel de cazuri cu evoluție imprezvizibilă sugerează necesitatea unei monitorizări atente la toți pacienții cu PA, chiar dacă datele preliminare sugerează o formă ușoară a bolii. Studii suplimentare vor fi necesare în viitorul apropiat pe această temă, atât pentru îmbunătățirea terapiei cât și pentru a stabili un scor prognostic cât mai bun, eventual prin includerea de noi elemente de diagnostic și monitorizare.

**Cuvinte cheie:** pancreatită acută, forme alitiazice, evoluții severe, pacienți tineri de sex feminin