

Duodenopancreatectomie totală laparoscopică cu preservarea splinei și a vaselor splenice, pentru neoplazie mucinoasă pancreatică intraductală (IPMN): prezentare de caz și tehnică chirurgicală

Adrian Bartoș^{1,2}, Patricia Pleșa-Furda², Raluca Stoian³, Lidia Ciobanu^{4,5}, Dana Iancu^{2,6}, Cornel Iancu², Caius Breazu^{7,8}

¹Department of Surgery, "Iuliu Hațieganu" University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca, Romania

²Department of Surgery. "Prof. Dr. Octavian Fodor" Regional Institute of Gastroenterology and Hepatology, Cluj-Napoca, Romania

³Department of Surgery, Gherla County Hospital, Romania

⁴Department of Gastroenterology, "Iuliu Hațieganu" University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca, Romania

⁵Department of Gastroenterology, "Prof. Dr. Octavian Fodor" Regional Institute of Gastroenterology and Hepatology, Cluj-Napoca, Romania

⁶Anatomy and Embryology Department, "Iuliu Hațieganu" University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca, Romania

⁷Department of Anesthesiology and Intensive Care, "Iuliu Hațieganu" University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca, Romania

⁸Department of Anesthesiology and Intensive Care, "Prof. Dr. Octavian Fodor" Regional Institute of Gastroenterology and Hepatology, Cluj-Napoca, Romania

Rezumat

Duodenopancreatectomia totală (DPT) realizată exclusiv pe cale laparoscopică este considerată una dintre cele mai complexe intervenții chirurgicale abdominale. DPT cu preservarea vaselor splenice (operația Kimura) este o variantă tehnică mai solicitantă pentru chirurg, dar cu beneficii pentru cazurile bine selecționate. În timp ce unele centre cu volum mare au câștigat experiență în pancreatectomii prin abord minim invaziv, chirurgia laparoscopică rămâne o recomandare pentru cazuri bine selecționate de pacienți prezentând tumori pancreatice benigne sau cu grad redus de malignitate și ar trebui să fie realizată cu precauție, doar de către chirurghi HPB experimentați. În acest articol, vă prezentăm cazul unui pacient ce a beneficiat în serviciul nostru de duodeno-pancreatectomie totală cu preservarea vaselor splenice și a splinei, efectuată pe cale pur laparoscopică, pentru diagnosticul de IPMN difuz. Articolul ilustrează principalii timpi operatori.

Cuvinte cheie: pancreatectomie totală laparoscopică, neoplazie mucinoasă pancreatică intraductală, pancreatectomie cu preservarea splinei, preservarea vaselor splenice