

**Rezecție pancreatică distală și chimioterapie hipertermică intraperitoneală (HIPEC) simultane pentru carcinomatoza peritoneală în adenocarcinomul pancreasului - prezentare de caz**

Jan Bardenhagen, Mara Goetz, Jakob Izbicki, Faik Güntac Uzunoglu

Department of General, Visceral and Thoracic Surgery, University Medical Centre, Hamburg-Eppendorf, Hamburg, Germany

**Rezumat**

Cancerul pancreatic rămâne una dintre cele mai mari provocări în oncologie, deoarece majoritatea pacienților sunt diagnosticați într-un stadiu de diseminare limfatică regională sau sistemică a bolii. 10% dintre pacienți prezintă carcinomatoză peritoneală la diagnostic. În ultimele decenii, a fost dezvoltată chirurgia cito-reductivă (CRS) combinată cu chimioterapia intraperitoneală intraoperatorie hipertermică (HIPEC), ce reprezintă o nouă opțiune de tratament individualizat pentru pacienții cu cancer diseminat peritoneal. Această prezentare descrie cazul unui bărbat de 39 de ani diagnosticat inițial cu carcinom al cozii pancreatice și carcinomatoză peritoneală localizată. Ca abordare individualizată, a fost recomandată chimioterapia neoadjuvantă. Stadializarea ulterioară a relevat o reducere a dimensiunii tumorii. Chirurgia citoreductivă (CRS) ce a inclus splenopancreatectomia distală a fost efectuată și urmată de HIPEC. Postoperator, pacienta a dezvoltat o fistulă pancreatică relevantă clinic, însă remisă, și a primit chimioterapie adjuvantă. În cancerul pancreatic cu carcinomatoză peritoneală localizată, asocierea dintre CRS și HIPEC este o opțiune valabilă în cazurile extrem de selecte, cu o supraviețuire globală potențial extinsă și o calitate a vieții acceptabilă.

**Cuvinte cheie:** cancer pancreatic, adenocarcinom pancreatic, carcinomatoză peritoneală, HIPEC, chirurgie citoreductivă