

Beneficiul adus în supraviețuire de rezecția hepatică ecoghidată repetată în absența chimioterapiei pentru metastaze hepatice recurente de origine colorectală

Alin Kraft¹, Alexandru Bârcu^{2,3}, Darina Barzan³, Radu Dumitru⁴, Adina Croitoru^{5,6}, Vlad Herlea^{6,7}, Irinel Popescu^{3,6} and Florin Botea^{3,6}

¹Department of General Surgery, Regina Maria Military Emergency Hospital, 500007 Brașov, Romania

²Doctoral School in Medicine, Titu Maiorescu University, 040441 Bucharest, Romania

³Dan Setlacec Center for General Surgery and Liver Transplant, Fundeni Clinical Institute, 022328 Bucharest, Romania

⁴Radiology and Medical Imaging Department, Fundeni Clinical Institute, 050474 Bucharest, Romania

⁵Department of Oncology, Fundeni Clinical Institute, 022328 Bucharest, Romania

⁶Faculty of Medicine, Titu Maiorescu University, 031593 Bucharest, Romania

⁷Department of Pathology, Fundeni Clinical Institute, 022328 Bucharest, Romania

Rezumat

Prezentăm cazul unei paciente de sex feminin, în vârstă de 54 de ani, diagnosticată cu neoplasm rectal stadiul IV, cu multiple metastaze hepatice sincrone (12), cea mai mare având 10 cm în diametru, distribuite bilobar. Managementul operator a constatat într-o rezecție simultană rectală anterioară ultra-joasă efectuată prin abord robotic, cu anastomoză coloanală (protejată prin ileostomie) și rezecții hepatice ecoghidate non-anatomice multiple (efectuate prin abord deschis). Pacienta nu a putut urma chimioterapie neoadjuvantă și adjuvantă din cauza efectelor secundare sistemice. Boala intra-hepatică a prezentat 2 episoade de recidivă, sancționate prin rezecții hepatice non-anatomice ghidate ecografic de tip „parenchima sparing”. În total 32 de metastaze hepatice au fost tratate (31 rezecate și 1 ablată prin radiofrecvență). Pacienta a prezentat 1 episod de recidivă cu localizare pulmonară, sancționată printr-o lobectomie superioară dreaptă cu limfadenectomie, pentru o metastază singulară. Pacienta a decedat pe seama progresiei bolii atât intra-, cât și extrahepatic la 34 de luni după prima intervenție chirurgicală.

Cuvinte cheie: neoplasm colorectal, metastaze hepatice, rezecție hepatică, supraviețuire globală