

Transferul liber vascularizat de ganglioni limfatici din oment – un punct cheie în managementul limfedemului

Anca Bordianu^{1,2}, Ion Petre³, Anca Bobircă^{2,4}, Florin Bobircă^{2,5}

¹Department of Plastic Surgery and Reconstructive Microsurgery, Bagdasar-Arseni Emergency Hospital Bucharest, 041915, Romania

²Carol Davila University of Medicine and Pharmacy Bucharest, 020021, Romania

³Department of Functional Sciences, Medical Informatics and Biostatistics Discipline, Victor Babes University of Medicine and Pharmacy, 300041 Timisoara, Romania

⁴Department of Rheumatology & Internal Medicine, Dr I Cantacuzino Clinical Hospital, Bucharest 030167, Romania

⁵Department of General Surgery, Dr I Cantacuzino Clinical Hospital, 030167, Bucharest, Romania

Rezumat

Introducere: Pe măsură ce un număr tot mai mare de femei înving cancerul de sân în întreaga lume, limfedemul asociat cancerului de sân a câștigat mai multă atenție recent. Transferul liber vascularizat de oment reprezintă un instrument util pentru cazurile avansate și recurente. Scopul lucrării este de a analiza avantajele și dezavantajele acestei metode.

Materiale și metode: Acest studiu retrospectiv a fost realizat pe un lot de 17 pacienți cunoscuți cu cancer de sân care au beneficiat de transfer liber vascularizat de oment. Datele au fost înregistrate între ianuarie 2022 și ianuarie 2023. În studiu au fost incluși pacienți diagnosticați cu limfedem secundar stadiul II sau III, cu rezultat insuficient în urma efectuării anastomozelor limfovenoase anterioare.

Rezultate: Cel mai frecvent afectat a fost membrul superior stâng (59%), unde edemul a fost identificat în principal la nivelul antebrăului (75%). Cu toate acestea, mai mult de jumătate dintre subiecți au avut anterior anastomoze limfovenoase. Corelația dintre stadiul limfedemului și reducerea postoperatorie a volumului membrului afectat a fost de -0,26, panta ajungând la -0,33, cu o valoare intercept de 2,64. Monitorizarea postoperatorie a arătat o reducere a volumului membrelor superioare și o îmbunătățire a calității vieții pacienților.

Concluzii: Experiența chirurgilor face ca acest lambou versatil să aducă speranță supraviețuitorilor cancerului de sân afectați de limfedem.

Cuvinte cheie: limfedem, bypass limfovenos, transferul vascularizat de ganglioni limfatici, lambou de oment, microchirurgie