

Factorii de prognostic în pancreatita cronică acutizată: perspective dintr-o cohortă dintr-un centru terțiar din România

Petruta Violeta Filip^{1,2}, Corina Silvia Pop^{1,2}, Laura Sorina Diaconu^{1,2}, Flori Elena Tapu², Nicoleta Tiuca^{1,2}, Dana Galieta Mincă^{1,3}

¹Carol Davila University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Romania

²Department of Internal Medicine and Gastroenterology, University Emergency Hospital of Bucharest, Romania

³National Institute of Public Health, Bucharest, Romania

Rezumat

Context/ Obiective: Acest studiu a avut ca scop evaluarea și compararea severității pancreatitei acute (PA) la pacienții cu și fără pancreatită cronică (PC) subiacentă.

Metode: Am inclus pacienți diagnosticați cu PA și i-am clasificat în PC și fără PC. Severitatea bolii a fost definită prin prezența insuficienței de organ, a internării în unitatea de terapie intensivă (UTI) sau a mortalității.

Rezultate: PC a reprezentat 25.85% din toate cazurile de PA din studiu. Pacienții cu PC au fost mai frecvent bărbați fumători cu IMC scăzut, niveluri mai scăzute de albumină și scoruri Balthazar mai mari. În schimb, pacienții cu PA (fără PC) au avut frecvențe cardiace (FC), scoruri Balthazar și scoruri CTSI semnificativ mai mari. Durata spitalizării și ratele de mortalitate au fost mai mari la pacienții cu PA, care au fost asociați cu o rată ridicată de disfuncție organică. Factorii de prognostic care au influențat supraviețuirea la 72 de ore au fost insuficiența respiratorie, raportul creatinină/albumină, BISAP, nivelurile de albumină și injurie renală acută. Între timp, supraviețuirea la 30 de zile a fost influențată de insuficiența respiratorie, raportul creatinină/albumină și azotul ureic din sânge.

Concluzii: Comparativ cu PA fără PC, ACP este asociată cu o evoluție a bolii mai puțin severă, mortalitate mai mică, insuficiență de organ redusă și șederi mai scurte la ATI. Cu toate acestea, ACP este observată mai frecvent la fumătorii de sex masculin cu valori IMC și albumină mai mici și scoruri CTSI și Balthazar mai mari.

Cuvinte cheie: pancreatită acută, pancreatită acută pe pancreatită cronică, severitate, mortalitate