

## **Înteruperea venoasă extraluminală în tromboza flotantă a venelor profunde ale membrilor inferioare**

D. Casian, E. Gutsu, V. Culiuc

Chair of General Surgery, Medical University "Nicolae Testemitsanu", Chisinau, Moldova

### **Rezumat**

Tromboza flotantă (TF) reprezintă o formă particulară a trombozei venelor profunde cu un potențial de embolizare pulmonară fatală extrem de elevat. Scopul studiului a constat în evaluarea rezultatelor precoce ale abordului chirurgical agresiv al TF. Pe parcursul anilor 2005-2008 TF a fost diagnosticată la 13 pacienți. Caracteristica demografică a bolnavilor: vârsta (media) – 54.7 ani, bărbați – 76.9%, comorbidități semnificative – 5 (38.5%) pacienți. Localizarea TF: vena femurală superficială (VFS) – 5 (38.5%), vena femurală comună (VFC) – 4 (30.7%), vena iliacă externă (VIE) – 2 (15.4%), vena cavă inferioară (VCI) – 2 (15.4%). Manifestările embolismului pulmonar au fost documentate preoperator în 3 (23.1%) cazuri. S-au efectuat următoarele intervenții chirurgicale de urgență: ligaturarea – 3 (23.1%) sau plicația VFS – 2 (15.4%); plicația VFC – 5 (38.5%) pacienți, combinată în 4 cazuri cu trombectomia parțială (partea flotantă a trombului); plicația venei iliace comune – 1 (7.6%); plicația VCI – 2 (15.4%) cazuri. În perioada postoperatorie precoce cazuri de embolism pulmonar primar sau recurent, clinic semnificativ, nu au fost detectate. Experiența tratamentului chirurgical al bolnavilor cu TF relevă rolul important al ligaturării/plicației venelor profunde în prevenirea embolismului pulmonar fatal.

**Cuvinte cheie:** tromboza venelor profunde, tromboza flotantă, tratament chirurgical, întreruperea venoasă

**Correspondență:** Dr. Dumitru Casian

Str. Vasile Lupu 29, ap. 32, Chisinau, Moldova, 2008

Tel.: 373-22-275455, 373-79-155903

E-mail: dcasian@mail.ru