

**Infarct entero-mezenteric venos cvasitotal acut posttraumatic**

C. Truș<sup>1</sup>, M. Munteanu<sup>2</sup>, G. Diaconu<sup>1</sup>, A. Beznea<sup>1</sup>, A. Pop<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Clinica chirurgie I, Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sf. Apostol Andrei”, Galați

<sup>2</sup>Secția de chirurgie vasculară, Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sf. Apostol Andrei”, Galați

<sup>3</sup>Laboratorul de Medicină Nucleară și Ultrasonete, Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sf. Apostol Andrei”, Galați

**Rezumat**

Lucrarea prezintă un caz de infarct entero-mezenteric de tip venos survenit la un bărbat de 34 de ani, descoperit intra-operator, când s-a intervenit chirurgical în urgență, pentru abdomen acut chirurgical de tip peritonitic. Etiologia infarctului venos a fost posttraumatică, pacientul suferind o agresiune abdominală cu șapte zile înainte de debutul simptomatologiei. În literatură infarctele venoase cu etiologie posttraumatică sunt întâlnite într-un număr redus în raport cu numărul mare al contuziilor abdominale, la factorul lezional intimal asociindu-se hipercoagulabilitatea sangvină. Explorările paraclinice nu au conferit date semnificative în ceea ce privește diagnosticul preoperator; intervenția chirurgicală (trombectomia anterogradă și retrogradă a venei mezenterice superioare cu sondă Fogarty și venorafia) a avut o evoluție favorabilă. Intervenția de dez-obstrucție venoasă mezenterică este practică ca o metodă de excepție, pornindu-se de la ideea că trombozele venoase se propagă în vena mezenterică și colateralele acesteia, urmate de tromboza arterială extinsă și compromiterea totală a viabilității intestinale.

**Cuvinte cheie:** infarct entero-mezenteric de tip venos, tromboză venoasă mezenterică superioară, trombectomie venoasă

**Correspondență:** Dr. Adrian Beznea

Str. Armata Poporului nr.24, bl. LC7,sc.3, ap.38, 800085, Galați, Romania

e-mail: adrianbeznea@hotmail.com