

**Veziula de porțelan - particularități diagnostice și terapeutice**

E. Suliman<sup>1</sup>, R. Palade<sup>1</sup>, D. Voiculescu<sup>1</sup>, G. Simion<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Clinica Chirurgie I, Spitalul Universitar de Urgență, București

<sup>2</sup>Departamentul de Anatomie patologică, Spitalul Universitar de Urgență, București

**Rezumat**

Veziula de porțelan (VP) este o entitate rară. Asocierea ei cu litiua colecistului se întâlnește frecvent (90%). Diagnosticul se stabilește în urma explorărilor imagistice (radiografia abdominală simplă, ecografia și/sau CT abdominale). Din punct de vedere histopatologic e vorba de un proces extins de calcificare a peretelui vezicular. În literatură s-a menționat cu insistență asocierea VP cu neoplasmul de veziculei biliare. De aceea colecistectomia laparoscopică a fost formal contraindicată. Prezentăm două cazuri de VP operate laparoscopic și cu această ocazie trecem în revistă aspectele particulare de diagnostic și tratament ale afecțiunii.

**Cuvinte cheie:** veziula de porțelan, litiua biliară, colecistectomie laparoscopică, neoplasmul de vezică biliară

**Correspondență:** Dr. Emel Suliman

Spitalul universitar de Urgență București, Clinica Chirurgie I

Splaiul Independenței nr. 169, sector 5, 050098 București, România

E-mail: emel\_suliman@yahoo.com