

**Ileusul biliar: analiza a opt cazuri și recenzia literaturii**

I. Brezean, S. Aldoescu, E. Catrina, N. Fetcu, I. Marin, E. Păcescu  
Department of Surgery, "Dr. I. Cantacuzino" Clinical Hospital, Bucharest

**Rezumat**

*Scop:* propunem o analiză a cazurilor de ileus biliar operate în clinică, prilejuită de un caz de sindrom Bouveret.

*Metoda:* studiu retrospectiv al cazurilor de ileus biliar operate în clinica noastră în ultimii 26 de ani, urmărind elementele diagnostice, intervalul scurs până la operație, tipul intervenției și evoluția post-operatorie.

*Rezultate:* în această perioadă s-au operat 9143 litiaze biliare descoperindu-se 27 fistule biliodigestive din care 8 s-au complicat cu ileus biliar. Ileusul a survenit exclusiv la femei vârstnice cu comorbiditate importantă. Diagnosticul sugerat de semnele clinice ale ocluziei acute sau subacute, a fost susținut de investigații imagistice a căror valoare diagnostică a fost diferită. Intervalul scurs de la internare până la operație a fost de 2,6 zile. Atitudinea chirurgicală a oscilat între simpla enterolitomie și asocierea acesteia cu desființarea fistulei biliodigestive. Evoluția a fost favorabilă în majoritatea cazurilor cu o excepție (1 deces).

*Concluzii:* ileusul biliar este o afecțiune rară, survenită la vârstnici cu comorbiditate importantă. Alegerea procedurii chirurgicale depinde de impactul sindromului ocluziv și de comorbiditatea asociată, tipul intervenției neinfluențând semnificativ morbiditatea și mortalitatea post-operatorie.

**Cuvinte cheie:** fistula colecisto-duodenală, ileus biliar, sindrom Bouveret

**Correspondență:** Conf. Dr. Iulian Brezean

Department of Surgery, "Dr. I. Cantacuzino" Clinical Hospital Bucharest, Romania

E-mail: dribrezean@yahoo.com