

Ulcer jejunal de tip ischemic, perforat. Prezentare de caz

C. Iancu¹, A. Bartoș², D. Bartoș¹, L. Mocan², R. Bodea²

1UMF "Iuliu Hațieganu", Clinica Chirurgie III, Cluj-Napoca, România

2Clinica Chirurgie III, Cluj-Napoca, România

Rezumat

Leziunile ulcerative ischemice ale intestinului subțire reprezintă o patologie abdominală rară. Prezentăm cazul unui pacient în vârstă de 68 ani care s-a internat în serviciul nostru acuzând dureri abdominale, grețuri, vărsături. Examinările paraclinice (ecografia abdominală și endoscopia digestivă superioară) au ridicat suspiciunea unei leziuni ulcerative jejunale, perforate. Intervenția chirurgicală a confirmat diagnosticul, punând în evidență un ulcer jejunal, perforat și blocat de ansele enterale învecinate. Trombul mezenteric vizibil macroscopic intraoperator ne-a indicat etiologia ischemică a leziunii. Rezultatul anatomopatologic, coroborat cu examinarea clinică și paraclinică ne-a orientat către diagnosticul de trombangită obliterantă, cauză a ischemiei mezenterice; problemele ridicate de acest diagnostic sunt legate în primul rând de urmărirea pe termen lung a pacientului, pentru a surprinde la timp eventualele recurențe ischemice viscerale.

Cuvinte cheie: ulcer jejunal, ischemie viscerală, perforație enterală, trombangită obliterantă

Correspondență:

Dr. Adrian Bartoș

Clinica Chirurgie III, Cluj-Napoca, România

str. Croitorilor, Nr. 19-21

E-mail: bartos.adi@yahoo.fr