

Stenoză biliară malignă tratată prin două stenturi percutanale - prezentare de caz

M. Radovanovic¹, M. Radojkovic², M. Stojanovic², S. Ristic¹, G. Stanojevic², L. Jeremic², Z. Siric¹, Z. Rancic³, B. Ilic²

¹Radiology Institute, Clinical center Nis, Serbia

²Surgery clinic, Clinical center Nis, Serbia

³Division of Cardiac and Vascular Surgery, Departments of Surgery, University Hospital Zürich, Switzerland

Rezumat

Introducere: În ultimele 3 decenii radiologia intervențională a devenit cel mai important instrument în tratamentul paliativ al pacienților cu stenoze biliare maligne.

Prezentare de caz: Raportăm cazul unui pacient cu obstrucție biliară malignă, determinată de o tumoră recidivantă a canalului hepatic comun restant, cu infiltrarea hepaticojejunostomei create anterior. Decompresia biliară a fost obținută prin plasarea a două stenturi metalice auto-expandabile.

Discuție: La pacientul prezentat, abordul percutanat a fost obligatoriu din cauza intervenției chirurgicale anterioare. De asemenea, având în vedere nerezecabilitatea leziunii recidivante și prognosticul prost și definitiv, era preferabil realizarea drenajului biliar intern. De aceea plasarea stentului metalic auto-expandabil a fost metoda terapeutică de elecție.

Concluzie: Scopul intervențiilor radiologice minim invazive percutanate este obținerea decompresiei biliare eficiente cu drenaj biliar intern când este posibil.

Cuvinte cheie: stenoză biliară malignă, radiologie intervențională

Corresponding author: Milan Radojkovic

Sestre Bakovic 14/28, 18000 Nis, Serbia

Tel.: +381 69 716567

E-mail: mida71@open.telekom.rs