

Cancerul tiroidian - leziunile maligne din lobul contralateral

F. Vărcuș¹, D. Bordoș¹, M. Cornianu², A. Nicolicea¹, A. Coman¹, F. Lazăr¹

¹Clinica 2 Chirurgie, Spitalul Județean de Urgență, Timișoara, România

²Laboratorul de Anatomie Patologică, Spitalul Județean de Urgență, Timișoara, România

Scopul studiului de față a fost analizarea frecvenței leziunilor maligne din lobul tiroidian contralateral, după totalizarea tiroidectomiei pentru leziuni maligne în lobul ipsilateral, pentru a stabili la care pacienți este indicată totalizarea.

Material și metodă: Studiul a fost efectuat pe 228 pacienți la care s-a practicat totalizarea tiroidectomiei după ce examenul anatomopatologic la parafină a confirmat existența cancerului tiroidian în primul lob excizat.

Rezultate: La 94(41,2%) dintre pacienții studiați au fost găsite leziuni maligne și în lobul contralateral. Dintre pacienții cu cancer tiroidian în lobul ipsilateral <1 cm diametru 1(4,7%) pacient a avut cancer tiroidian în lobul contralateral. La pacienții cu cancere tiroidiene în lobul ipsilateral având diametrul >1 cm diametru frecvența cancerului în lobul contralateral a fost cuprinsă între 42,8% și 47,6%.

Concluzii: La pacienții cu cancer tiroidian >1 cm diametru în lobul ipsilateral, leziunile maligne în lobul contralateral au o frecvență care impune totalizarea sistematică.

Cuvinte cheie: cancerul tiroidian, tiroidectomie, lobul contralateral

Corespondență: Flore Varcus, PhD, MD
Surgical Clinic 2, "Victor Babeș" University of Medicine and Pharmacy
Piața E. Murgu no. 2, Timișoara, Romania
Tel. / fax: 0040-256273872
E-mail: varcus.florian@yahoo.com