

Luxație bilaterală de șold la un pacient de 79 de ani

O. Alexa¹, T. Cozma¹, B. Puha¹, I.D. Alexa²

¹Department of Orthopedics and Trauma, University of Medicine and Pharmacy Iași, Romania

²Department of Geriatrics, University of Medicine and Pharmacy Iași, Romania

Luxația bilaterală de șold este o leziune rară, în special dacă nu există modificări anatomice ale șoldului sau laxitate ligamentară. Au fost publicate până în prezent mai multe cazuri de acest tip apărute de obicei la pacienți adulți. Cel mai frecvent au fost implicați pacienți în vârstă de 20-30 ani deoarece în cazul unui traumatism important la adulți femurul este suficient de rezistent pentru a nu se produce o fractură și astfel crește posibilitatea producerii unei luxații de șold. După știința noastră, cel mai vârstnic pacient descris în literatură cu luxație bilaterală de șold avea vârsta de 65 de ani. Prezentăm un pacient în vârstă de 79 de ani care a suferit un traumatism ce a constat în căderea unei greutăți pe coapse, cu direcție antero-posterioară. Pe baza examenului clinic și radiologic s-a stabilit diagnosticul de luxație posterioară bilaterală de șold. Au fost identificate și fracturi asociate (fractură acetabulară stângă și fractură ram ilio-ischio pubian stâng) dar acestea nu au influențat semnificativ conduita sau prognosticul. Sub rahianestezie luxațiile au fost reduse prin metoda ortopedică. Particularitatea cazului constă, pe lângă raritatea leziunii bilaterale, în vârsta pacientului și considerăm că acesta este cel mai vârstnic pacient prezentat în literatură cu luxație bilaterală de șold.

Cuvinte cheie: luxație bilaterală de șold, pacient geriatric

Corresponding author: O. Alexa Associate Professor
University of Medicine and Pharmacy Iași
Department of Orthopedics and Trauma
Universității 16 street, Iași, Romania
E-mail: ovidiu_alexu@yahoo.com