

Polip hamartomatos duodenal unic - prezentare de caz clinic

L. Alecu, A. Tulin, Beatrice Ursut, B. Ursut, Al. Oproiu, F. Obrocea
Spitalul de Urgență "Prof. dr. Agrippa Ionescu", București, România

Rezumat

Tumorile duodenale sunt tumori foarte rare, având cea mai mică incidență din totalul tumorilor intestinului subțire. Frecvența tumorilor intestinului subțire este sub 5% din totalul tumorilor digestive. Majoritatea acestor tumori rămân asimptomatice, uneori toată viața. Atunci când devin simptomatice, prima manifestare este reprezentată de pierderea de sânge digerat (melenă), anemie secundară și simptomatologie obstructivă (ocluzii, subocluzii). Diagnosticul precoce al acestor tumori este dificil datorită simptomatologiei nesistematizate, el devenind facil în momentul în care se instalează complicațiile. Cel mai frecvent, diagnosticul se realizează prin endoscopie digestivă superioară, urmată de tranzit baritat, computer tomografie și ecografie. În lucrarea de față vom prezenta un caz clinic de polip hamartomatos duodenal, unic, localizat la nivelul D3, la o pacientă în vârstă de 66 ani, ce s-a prezentat pentru hemoragie digestivă superioară exteriorizată prin melenă, anemie secundară, astenie fizică marcată, la care s-a intervenit chirurgical și s-a practicat excizia, prin duodenotomie, a polipului.

Cuvinte cheie: polip hamartomatos, melenă, excizie, tumori duodenale

Correspondență: Dr. Lucian Alecu
Spitalul de Urgență "Prof. dr. Agrippa Ionescu", București, România
E-mail: lucianalecu@yahoo.com