

Veziula de porțelan – abord laparoscopic

E. Târcoveanu, A. Vasilescu, Șt. Georgescu, V. Filip, N. Vlad

Universitatea de Medicină și Farmacie "Gr.T. Popa" Iași, România

Clinica I Chirurgie "I. Tănăsescu – Vl. Buțureanu", Spitalul "Sf. Spiridon" Iași, România

Rezumat

Mult timp, vezicula de porțelan a fost considerată o contra-indicație relativă pentru colecistectomia laparoscopică, din cauza incidenței ridicate a cancerului veziculi biliare. Din cele 12.000 de colecistectomii practicate în Clinica I Chirurgie Iași, 5(0,04%) pacienți au fost diagnosticați cu veziculă de porțelan. Toți pacienții au fost investigați ecografic. Pacienții au fost clasificați cu veziculă de porțelan tip I sau II în funcție de examenul ecografic: trei cazuri cu veziculă de porțelan tip I și două cazuri cu veziculă de porțelan tip II (într-un singur caz am găsit asociat carcinomul veziculi biliare). Vom descrie o serie de trei cazuri cu veziculă de porțelan tip I (calcificarea completă a peretelui vezicular), tratate prin abord laparoscopic. Colecis-tectomia laparoscopică a fost dificilă din cauza aderențelor și dificultăților de prehensiune a colecistului, dar cu o evoluție postoperatorie favorabilă în toate cazurile. Rezultatele examenului histopatologic au stabilit diagnosticul de veziculă biliară de porțelan tip I, fără modificări neoplazice în peretele calcificat al colecistului. Putem trage concluzia pe baza cazurilor prezentate și review-ul literaturii de specialitate că deși există o rată mare de conversie, colecistectomia laparoscopică este recomandată la bolnavi cu veziculă de porțelan tip I, utilizând în selecția preoperatorie ecografia.

Cuvinte cheie: veziculă biliară de porțelan, colecistectomia laparoscopică

Correspondență:

Prof. dr. Eugen Tarcoveanu

Clinica I Chirurgie "I. Tănăsescu – Vl. Buțureanu"

Universitatea de Medicină și Farmacie "Gr. T. Popa", Spitalul Sf. Spiridon Iași

str. Independenței, nr. 1, 700111, Iași, România

E-mail: etarcov@yahoo.com.