

Melanom malign intestinal perforat: probleme de diagnostic și tratament

I.D. Vîlcea¹, I. Vasile¹, A-M. Vîlcea², C.S. Mirea¹, C.F. Popescu³, P. Mitrut⁴

¹Surgical Clinic II, University of Medicine and Pharmacy of Craiova, Romania

²Dermatology Clinic, University of Medicine and Pharmacy of Craiova, Romania

³Department of Pathology, Emergency County Hospital of Craiova, Romania

⁴Medical Department II, University of Medicine and Pharmacy of Craiova, Romania

Rezumat

Melanomul malign intestinal, rar întâlnit în practica medicală curentă, pune delicate probleme de diagnostic și atitudine terapeutică. Majoritatea cazurilor de melanom malign intestinal reprezintă metastaze ale unei leziuni cutanate dar sunt situații în care leziunea inițială nu poate fi diagnosticată, putând fi considerate melanoame intestinale primitive. Lucrarea prezintă cazul unui bărbat de 50 de ani, diagnosticat și operat în urgență pentru peritonită acută difuză determinată de perforația unei tumori jejunale; în cursul laparotomiei exploratorii au fost descoperite șase tumori jejuno-ileale, care au impus practicarea a trei enterectomii segmentare urmate de anastomoze entero-enterale. Evoluția postoperatorie inițială fără incidente, a fost marcată, la distanță, de apariția de multiple metastaze subcutanate și o metastază masivă mediastinală care a condus la decesul pacientului la 18 luni de la diagnosticul inițial. În lucrare sunt discutate problemele de diagnostic și tratament, în special legate de originea primitivă sau secundară a leziunii intestinale, din moment ce după examinări repetate nu a putut fi diagnosticat un melanom malign cutanat sau într-o zonă cunoscută cu predispoziție pentru dezvoltarea melanomului malign.

Cuvinte cheie: melanom malign, melanom intestinal, melanom intestinal perforat

Corresponding author: Alina Maria Vîlcea, MD, PhD candidate
Papilian Victor Street No. 56, G8-1-1,
Craiova, Dolj County, 200753, Romania
E-mail: alina.vilcea@yahoo.com