

Litiază biliară la tineri: incidență, complicații, atitudine terapeutică

T. Constantinescu¹, Abdul Kariem H. Huwood Al Jabouri², E. Brătucu², C. Olteanu¹, M. Toma¹, A. Stoiculescu¹

¹Surgery Department, County Hospital Pitești, Romania

²Institute of Oncology Bucharest, Romania

Rezumat

Obiectiv: Scopul acestui studiu este de a evidenția cât de frecventă este litiaza biliară și care este etiologia ei la persoanele tinere, precum și faptul că debutul la această categorie de vârstă a fost prin complicații: pancreatită acută, icter.

Material și metodă: Acest studiu retrospectiv a fost realizat în perioada ianuarie 2007 - februarie 2012 în cele două secții de chirurgie ale Spitalului Județean Pitești și a fost bazat pe analiza foilor de observație și a protocoalelor operatorii. În această perioadă s-au efectuat 1905 colecistectomii din care 1023 pe cale laparoscopică și 882 clasic.

Rezultate: Lotul selectat cuprinde 36 de paciente cu vârste între 16 și 25 de ani. Colecistectomiile la 34 de paciente s-au efectuat pe cale laparoscopică și numai la două paciente pe cale clasică. 6 paciente au prezentat icter postoperator. Sub tratament medicamentos la 3 paciente icterul s-a remis într-un interval de 3-5 zile postoperator. La celelalte 3 paciente s-a practicat endoscopie retrogradă de cale biliară principală la 4-5 zile postoperator.

Concluzii: Cei mai importanți factori de risc ai litiazei biliare sunt: vârsta, sexul feminin, sarcina și obezitatea. Complicații frecvente ale litiazei biliare la tineri sunt: litiaza coledociană și pancreatita acută.

Cuvinte cheie: litiaza biliară, vârsta, complicații

Corresponding author: Teodor Catalin Constantinescu, M.D.

Surgery Department, County Hospital Pitești, Romania

E-mail: teodorcatalin@gmail.com