

Riscul artroplastii de șold sau genunchi la bolnavii transplantați hepatic sau renal

H. Orban^{1,2}, R. Adam¹, C. Orban³

¹Elias Emergency University Hospital, Bucharest, Romania

²University of Medicine and Pharmacy "Carol Davila", Bucharest, Romania

³Fundeni Clinical Institute, Bucharest, Romania

Rezumat

În ultimii ani rata transplantului renal sau hepatic a crescut considerabil, în același timp crescând și rata afecțiunilor osoase secundare medicației imunosupresoare. Astfel va crește și predispoziția acestor bolnavi către artroplastia de șold sau genunchi. Deși artroplastia reprezintă o intervenție sigură în cazurile obișnuite, siguranța sa în cazul pacienților transplantați este incertă. Scopul acestui studiu este evaluarea siguranței și a durabilității artroplastiei de șold sau genunchi la pacienții transplantați hepatic sau renal. În studiul nostru au fost incluse 5 artroplastii de șold sau genunchi practicate la transplantați hepatic și renal. Toți pacienții au urmat terapie imuno-supresoare. Toate cazurile au urmat antibioterapie postoperator, iar pentru implanturile cimentate s-a utilizat ciment cu antibiotic. Nici un caz nu a prezentat sepsis postoperator sau la distanță, iar durabilitatea implantului nu a fost afectată din cauze direct legate de transplant. În concluzie artroplastia în cazul bolnavilor transplantați hepatic sau renal reprezintă o intervenție cu impact pozitiv asupra calității vieții acestora fiind sigură în condițiile unor minime măsuri de siguranță perioperatorii.

Cuvinte cheie: artroplastie șold/genunchi, transplant hepatic, transplant renal, imunosupresie, infecție, revizie implant

Corresponding author: Assoc. Prof. H. Orban

Elias Emergency University Hospital

Marasti avenue, nr. 17 sect 1, Bucharest

Tel. 0213-161600/277

E-mail: horiabogdan@live.com