

Intervențiile endoscopice pentru urolitiază: ce înseamnă “stone-free” în 2012

P. Geavlete, R. Multescu, B. Geavlete

Department of Urology, Saint John Emergency Clinical Hospital, Bucharest, Romania

Rezumat

Dezbaterea continuă în ceea ce privește tratamentul optim al urolitiazăi, un parametru important fiind rata de “stone-free”. Totuși, în ciuda simplității unor noțiuni precum rată de “stone-free” sau rată de succes, atunci când analizăm datele din literatură constatăm că în spatele lor se află noțiuni complexe, intricate sau chiar controversate. Problema majoră rezidă în modul heterogen în care este definit succesul intervențiilor, intervalul de timp la care este verificat statutul de “stone-free” și lipsa unui protocol standardizat strict de evaluare postoperatorie a pacientului cu urolitiază. Am efectuat o trecere în revistă a datelor disponibile în literatură, cu scopul de a identifica metode de îmbunătățire a standardizării acestor noțiuni.

Cuvinte cheie: absența restanțelor litiazice, fragmente litiazice reziduale, urolitiază

Corresponding author: Petrisor Geavlete, MD, PhD

Department of Urology Saint John Emergency Clinical Hospital

Vitan-Barzesti 13, Sector 4, 042122, Bucharest, Romania

Tel.: +40213445000, Fax: +40213345000

E-mail: geavlete@gmail.com