

Opțiuni terapeutice în diverticulita sigmoidiană. Când operăm?

Tr. Pătrașcu, H. Doran, E. Catrina, O. Mihalache

“I. Juvara” Department of Surgery, Clinical Hospital “Dr. I. Cantacuzino”, Bucharest, Romania

Rezumat

Diverticuloza colonică este o afecțiune benignă, a cărei incidență este în continuă creștere în întreaga lume și îndeosebi în țările avansate economic din vestul Europei. Această dinamică este corelată atât cu tendința generală de îmbătrânire a populației, diverticuloza fiind caracteristică vârstei a treia, cât și cu obiceiurile alimentare actuale. Frecvent, diverticuli colonici determină complicații: hemoragie sau diverticulită, cu abcese pericolice sau peritonită generalizată. În mod logic, există o preocupare pentru elaborarea unui algoritm terapeutic adecvat al bolii diverticulare, preponderența atitudinii conservatoare sau a celei chirurgicale suferind modificări continue. Am analizat opțiunile terapeutice, avantajele și limitele lor, raportându-ne atât la experiența Clinicii de chirurgie “Prof. I. Juvara” a Spitalului “Dr. I. Cantacuzino”, cât și la datele cele mai recente din literatura medicală.

Cuvinte cheie: diverticuloză, diverticulită sigmoidiană

Corresponding author: Prof. Dr. Traian Pătrașcu

“I. Juvara” Department of Surgery, Clinical Hospital “Dr. I. Cantacuzino”

Ion Movilă Street, no.5-7, Bucharest, Romania

E-mail: patrascutraian@gmail.com