

**Rezecție cu anastomoză primară și colostomie laterală modificată sau operație Hartmann.
Ce metodă trebuie efectuată pentru volvulusul gangrenos de sigmoid?**

S. Sozen, K. Das, H. Erdem, E. Menekse, S. Cetinkunar, F. Karateke

Department of General Surgery, Adana Numune Training and Research Hospital, Adana, Turkey

Rezumat

Scop: Pentru a evalua eficacitatea procedurii Hartmann și a rezecției cu anastomoză primară și colostomie laterală modificată pentru volvulus gangrenos de sigmoid.

Metode: Șaizeci și unu de pacienți operați între ianuarie 2004 - septembrie 2010 au fost analizați retrospectiv. Datele demografice ale pacienților, caracteristicile clinice, tipul de procedură chirurgicală efectuată, complicațiile postoperatorii, mortalitatea și durata de spitalizare după intervenția chirurgicală au fost analizate.

Rezultate: Spitalizarea medie, infecția de plagă și mortalitatea nu a diferit în mod semnificativ între cele două grupuri. Rata infecțiilor de plagă superficiale a fost mai mare în lotul A (32% vs 15%). Nu a fost observată apariția de fistule secundare închiderii stomei. În timpul perioadei de spitalizare, complicații postoperatorii au fost infecții ale plăgii la patru pacienți, abcese intraabdominale la doi pacienți, eviscerație și dehiscenta plăgii în două cazuri, aritmie în șase cazuri, pneumonie în opt cazuri. Ratele complicațiilor medicale și chirurgicale în cele 2 grupuri au fost similare ($p > 0,05$). În comparație, durata de spitalizare în terapie intensivă nu au fost statistic diferită ($p > 0,05$), dar durata medie de spitalizare a fost mai mare în grupul A decât grupul B ($p < 0,05$).

Concluzie: Sigmoidectomia ar trebui să fie principiul de bază în managementul volvulusului sigmoidian. Rezecția cu anastomoză primară și colostomie laterală modificată oferă rezultate satisfăcătoare. Este o tehnică ușor de efectuat la pacienții cu volvulus sigmoidian. Rezecție cu anastomoză primară și colostomie laterală modificată poate fi efectuată în condiții de siguranță la pacienții selectați, fără creșterea morbidității și a duratei medii de spitalizare.

Cuvinte cheie: colon, volvulus, tehnica chirurgicală, obstrucție intestinală

Corresponding author: Süleyman Çetinkunar, MD

Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği.

Serinevler Mah., Ege Bağtur Bulvarı, 01240, Yüreğir, Adana, Turkey

Tel & Fax: 90 322 355 01 44

E-mail: slmcetin@gmail.com