

Fenestrarea prin abord laparoscopic în boala polichistică hepatică complicată

T. Bara¹, Ș. Bancu¹, M. Mureșan¹, S. Mureșan², L. Bancu³, L. Denes⁴, T. Bara jr.¹

¹Surgical Department No. 2, Tg. Mureș, Romania

²Physiology Department, University of Medicine and Pharmacy Tg. Mureș, Romania

³Medical Department No. 2, Tg. Mureș, Romania

⁴Anatomy Department, University of Medicine and Pharmacy Tg. Mureș, Romania

Rezumat

Scop: Boala polichistică hepatică izolată este o formă rară de afecțiune ereditară chistică a ficatului, cu transmitere auto-somal dominantă. Se definește prin existența a numeroase chisturi de diferite mărimi în parenchimul hepatic, având o evoluție de obicei benignă.

Metodă: Prezentăm cazul unui bolnav de 80 de ani cu boală polichistică hepatică masivă, diagnosticată în urmă cu trei ani, prin ultrasonografie și computer tomografie abdominală. Odată cu apariția complicațiilor date de fenomene de tip compresiv datorită dimensiunilor mari ale chisturilor, bolnavul a prezentat dureri abdominale, grețuri, vărsături și scădere ponderală. Fenestrarea chisturilor prin abord laparoscopic a condus la rezoluția completă a simptomatologiei.

Rezultate: Bolnavul a fost mobilizat în ziua operației, și a fost externat în ziua 9 postoperator după suprimarea tubului de dren.

Concluzii: Boala polichistică hepatică izolată este o afecțiune rară. Tratamentul chirurgical este indicat numai în cazul complicațiilor. Abordul laparoscopic este o alternativă terapeutică în caz de nevoie. Bolnavii beneficiază de avantajele chirurgiei miniminvasive.

Cuvinte cheie: chisturi hepatice, abord laparoscopic

Corresponding author: Tivadar Bara, MD

Sângeorgiu de Mures, Principal street, no. 1028/A

Mures County, Romania

E-mail: barativadar@yahoo.com