

Recidivă simptomatică de hernie Bockdalek la adult, cauză rară de sindrom subocluziv

B. Moldovan¹, P. Biris², D. Pocreata¹, S. Vasile¹, L. Cimpeanu³, O. Jeder³, A. Badea³, A. Moldovan¹, L. Biris², E. Banu⁴, B. Angheloiu¹

¹General Surgery Department, «Sf. Constantin» Private Hospital Brașov, Romania

²Department of Radiology, «Regina Maria» Campus Brașov, Department of Radiology, University Hospital Tg-Mureș, Romania

³Intensive Care Unit, «Sf. Constantin» Private Hospital Brașov, Romania

⁴Department of Oncology, «Sf. Constantin» Private Hospital Brașov, Romania

Rezumat

Scop: prezentarea unei situații clinice rare, sindrom subocluziv prin recidivă de hernie Bockdalek stângă, accentuând aspectele de diagnostic radiologic și de tratament chirurgical. Lucrearea prezintă cazul unei paciente de 36 de ani, cu antecedente de hernie Bockdalek operată în urmă cu 7 ani printr-un procedeu tisular pe cale combinată toraco-abdominală, ce se prezintă cu un sindrom subocluziv de dată recentă și un sindrom algic epigastric. Endoscopia digestivă superioară evidențiază un ulcer duodenal HP pozitiv, iar un examen CT este etichetat ca fiind normal de un prim radiolog. Reevaluarea radiologică atentă și reconstrucțiile CT au permis evidențierea unei mici recidive de hernie Bockdalek, cu unghiul colic stâng ascensionat transdiafragmatic. Tratamentul chirurgical a constat într-o frenorafie monoplan și o aloplastie de întărire cu plasă de polipropilenă ce acoperă larg defectul, prin laparotomie. Evoluția postoperatorie a fost favorabilă, pacienta beneficiind de avantajele sistemului Fast-Track, cu externare în ziua a 2-a postoperator. Până în anul 2011, în literatura mondială sunt publicate un număr de 173 de cazuri de hernie Bockdalek, nici un caz nefiind o recidivă herniară. Hernia Bockdalek este o entitate clinică rară, cu o simptomatologie înșelătoare, ce predispune la erori de diagnostic și întârzierea tratamentului chirurgical, cu posibile consecințe nefaste. Tratamentul

chirurgical, pe cale clasică sau laparoscopică trebuie să respecte principiile moderne ale herniologiei, aloplastiiile de întărire prevenind apariția recidivelor.

Cuvinte cheie: hernie Bockdalek recidivată

Corresponding author: Bogdan Moldovan MD, PhD

Chief of Surgical Department, "St. Constantin" Hospital Brașov, Romania

Iuliu Maniu Street, no. 49, Brașov, Romania

E-mail: bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro