

Sindromul paraneoplazic în tumorile retroperitoneale primitive

O. Bratu¹, D. Mischianu¹, D. Spanu¹, R. Barla², P. Hoara², S. Constantinoiu²

¹Department of Urology, Emergency University Central Military Hospital "Dr. Carol Davila", Bucharest, Romania

²General and Esophageal Surgery Ward, Clinical Hospital "Sf. Maria", Bucharest, Bucharest, Romania

Rezumat

Introducere: Tumorile retroperitoneale reprezintă o patologie neoplazică aparte. Nici o altă patologie umană nu este mai săracă și mai înșelătoare ca și manifestare clinică specifică. Împrumutând de obicei simptomatologia organelor învecinate, tumorile retroperitoneale sunt descoperite cel mai adesea în stadii avansate sau incurabile.

Material și metodă: Vă prezentăm în lucrarea de față dificultatea diagnosticului în 3 cazuri de tumori retroperitoneale primitive, manifestate clinic prin sindromul paraneoplazic. Lotul de studiu a fost compus din pacienți diagnosticați cu tumori retroperitoneale primitive la examenul histopatologic. Majoritatea pacienților au fost selectați din specialități ca urologie sau chirurgie generală, dar am întâlnit cazuri și din alte specialități medicale.

Rezultate: Sindromul paraneoplazic reprezintă secreția unor variate substanțe biologice active de către tumoră. Hormoni, citokine, interleukine, anticorpi, fracțiuni ale complementului sunt doar câteva exemple de molecule active ce pot determina sindromul paraneoplazic. În studiul nostru am întâlnit 3 pacienți din 32 cu acest sindrom. Din istoricul și evoluția pacienților se observă dificultatea diagnosticării acestui tip tumoral.

Concluzii: Fiecare caz în parte a fost o provocare diagnostică, dar și chirurgicală. Sindromul paraneoplazic oferă un plus de dificultate stabilirii diagnosticului final, ceea ce duce de fapt la întârzierea tratamentului. Considerăm că este imperios necesară o colaborare intensă între diverse specialități chirurgicale și medicale pentru stabilirea cât mai precoce a unui diagnostic și tratament adecvate.

Cuvinte cheie: sindrom paraneoplazic, tumori retroperitoneale, semne clinice, substanțe biologice active

Corresponding author: Bratu Ovidiu, MD, PhD
Emergency University Central Military
Hospital "Dr. Carol Davila", Urology Ward
M. Vulcanescu no. 88; Bucharest, Romania
E-mail: ovi78doc@yahoo.com