

Tratamentul minim invaziv versus clasic al herniilor inghinale bilaterale

L. Timișescu, F. Turcu, R. Munteanu, C. Gîdea, L. Drăghici, O. Ginghină, N. Iordache
Emergency Clinical Hospital „Sfântul Ioan”, Bucharest, Romania

Rezumat

Obiective: Scopul acestui studiu este de a evalua comparativ rezultatele tratamentului laparoscopic (total extraperitoneal) și clasic (procedeul Lichtenstein) în herniile inghinale bilaterale operate într-o singură ședință operatorie.

Material și metodă: Au fost analizate toate cazurile internate și operate într-un singur timp operator, în Clinica de Chirurgie Generală a Spitalului Sfântul Ioan din București, cu diagnosticul de hernie inghinală bilaterală în perioada 2006-2011.

Rezultate: Lotul a fost împărțit în 2 grupuri în funcție de modalitatea de abord chirurgical: grupul de studiu laparoscopic (234 cazuri) și grupul martor procedeul Lichtenstein (91 cazuri). S-a înregistrat o conversie datorită dificultăților de disecție (0,4% din cazuri). În 6 cazuri (2,5%) din grupul laparoscopic s-au înregistrat complicații, iar în grupul clasic în 25 de cazuri (27,4 %) ($p<0,01$). Reintervenții s-au consemnat la 1,7 % din cazuri în grupul laparoscopic și la 2,1 % din cazuri în grupul clasic ($p<0,01$). Durata medie de spitalizare postoperatorie a fost 2,1 zile în grupul laparoscopic și 4,7 zile în grupul clasic. Nu s-au înregistrat decese.

Concluzii: În departamentul nostru indicația de elecție în herniile inghinale bilaterale este chirurgia laparoscopică care are rata complicațiilor de 10 ori mai mică, durata de spitalizare de 2 ori mai scurtă și aceeași rată de recidive ca și tehnica Lichtenstein.

Cuvinte cheie: laparoscopic, hernie inghinală bilaterală, total extraperitoneal, procedeu Lichtenstein, minim invaziv.

Corresponding author: Florin Turcu, MD

Department of General Surgery, Emergency Hospital „Sfântul Ioan”

Vitan Bârzești Road, no. 13, Bucharest, Romania

E-mail: florin_turcu@yahoo.com