

Esofagectomia transtoracică versus transhiatală: o permanentă dilemă. Experiența noastră

R.M. Neagoe¹, D. Sala¹, S. Voidazan², S. Bancu¹, L. Kiss³, H. Suciu⁴

¹Second Department of General Surgery, Emergency Mureș County Hospital, Târgu Mureș, Romania

²Epidemiology Department, University of Medicine and Pharmacy, Târgu Mureș, Romania

³First Department of General Surgery, Emergency Sibiu County Hospital, Sibiu, Romania

⁴Department of Cardiovascular Surgery, Emergency Mureș County Hospital, Târgu Mureș, Romania

Rezumat

Obiectiv: Abordul chirurgical al cancerului esofagian toracic rămâne controversat. Analizăm retrospectiv și comparativ esofagectomiile transtoracice și transhiatale efectuate în serviciul nostru.

Pacienți și metodă: În perioada 1997-2011, am identificat 100 de pacienți la care s-au efectuat esofagectomiile transtoracice sau transhiatale pentru carcinoame scuamoase esofagiene (90 de cazuri) sau adenocarcinoame (10 cazuri). Am urmărit date demografice și operatorii, morbiditatea, mortalitatea și supraviețuirea la 1-3 ani.

Rezultate: Abordul transtoracic a fost preferat pentru tumori semnificativ mai mari, localizate în treimea superioară și medie a esofagului, la pacienți mai tineri cu mai puține tare cardio-pulmonare asociate. Pierderile sanguine au fost semnificativ mai mari după esofagectomiile transtoracice ($p=0,0004$) iar aceste operații au durat semnificativ mai mult decât esofagectomiile transhiatale ($p=0,02$). Am identificat complicații postoperatorii la 70,7% dintre pacienții cu esofagectomie transtoracică, respectiv 59,3% dintre pacienții cu esofagectomie transhiatală. Mortalitatea la 30 de zile după esofagectomie transtoracică a fost 12,2% și respectiv 10,1% după abordul abdomino-cervical. Supraviețuirea la 1 an a fost 62,2%, la 2 ani - 39,3%, iar la 3 ani -15,1%.

Concluzii: Ambele aborduri chirurgicale sunt fezabile, cu rezultate comparabile, alegerea unei anumite tehnici fiind o chestiune ce ține de selecția pacientului dar și de preferința chirurgului operator.

Cuvinte cheie: esofagectomie transtoracică, esofagectomie transhiatală, morbiditate, mortalitate, supraviețuire

Correspondență:

Radu Mircea Neagoe, MD

Second Department of Surgery, Emergency Mures County Hospital

50 Gh. Marinescu street, 540136, Targu Mureș, Mureș, Romania

E-mail: neagoerm@gmail.com